

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

(ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, Avenue Nationale, La Neuville, B.P. 1154, 51056 Reims Cedex, Tél. 09.06.43 - 09.27.46

ABONNEMENT ANNUEL

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne


BULLETIN N° 6 du 30 Mars 1982

Edition Grandes Cultures

Envoi n° 4

BLÉ D'HIVER

Régulateurs de croissance



Stade début redressement sur les semis réalisés avant le 10 octobre. Les prochains réchauffements vont amener rapidement ces parcelles au stade épi à 1 cm.

S'il a été décidé l'emploi d'un régulateur surveillez maintenant ces parcelles. Spécialités à utiliser : Cycocel C 5, Bref, Courte Paille, Lagor, Nainit, Stop Verse (dose d'emploi 1,5 à 2,5 l/ha). Réaliser l'application par temps poussant (température d'au moins 12°).

Maladies

Piétin-verse rare, Fusariose plus fréquente. Traces d'oïdium sur Corin, Arminda en semis précoces. Aucune intervention n'est à réaliser prochainement.

Cas particuliers : piétin-verse sur 3e gaine, en semis très précoce, blé de betterave dans l'Aube. Si plus de 25 % de pieds touchés, traitement pouvant être envisagé prochainement avec application régulateur. Mais même dans ces rares situations le traitement piétin-verse devrait plutôt être encore retardé d'au moins une dizaine de jours.

ESCOURGEONS ET ORGES D'HIVER

Jaunisse nanisante

Quelques cas dans l'Aube avec une gravité très limitée.

Mosaïque jaune des escourgeons

Elle reste cantonnée aux zones touchées l'an passé (région de Reims, et quelques zones dans les Ardennes). Les parcelles atteintes ont tendance à reverdir et des confusions sont encore possibles avec les déchaussements dus au gel. Aussi éviter toute décision hâtive. Cependant prendre les précautions habituelles, éviter les antigraminées sur les parcelles douteuses.

Maladies

Piétin-verse très rare. Sur feuilles helminthosporiose assez fréquente en terre de craie, rhynchosporiose surtout en terres humides, oïdium récent. Aucune intervention n'est justifiée avant le stade 1er noeud.

P.18.

BETTERAVE

Pas de nouvelle spécialité homologuée cette année pour les traitements insecticides du sol au semis.

Tipules : attaques fréquentes l'an passé à l'intérieur d'une zone Châlons - Fère Champenoise - Vitry le François.


Les produits reconnus efficaces sont : Temik, Curater, Niomil, Garvox, Marshall, Temik LD, enrobage carbofuran.

Les betteraves venant après graminées fourragères, ou luzerne (2 ans après) sont les plus exposées, ainsi que dans une certaine mesure les parcelles très envahies par les repousses de céréales à l'automne.

Un traitement de rattrapage (parathion + endosulfan) est toujours possible mais très aléatoire.

Jaunisse parasitaire : assez fréquente l'an passé dans quelques zones. Ces attaques doivent surtout être mises sur le compte d'une année vraiment particulière. Toutefois dans les zones bien atteintes l'an passé (notamment à proximité des agglomérations) il semble utile de prévoir un insecticide au semis très actif contre les pucerons (Temik, Dacamon).

COLZA



Les cultures les plus hâtives arrivent au stade apparition des premiers boutons floraux.

L'absence de dégâts de charançon de la tige, l'an passé, nous met à l'abri de ce ravageur pour cette année. Un seul secteur fait exception, communes environnant Magnant dans le Barrois. Dans cette zone, les attaques étaient assez sérieuses en 1981. Si les captures de charançon en bac jaune dépassent 50 individus en une semaine un traitement est nécessaire. Le colza n'est plus sensible à ce ravageur lorsque la tige atteint 20 cm de hauteur.

Les captures de méligèthes sont très faibles. Il faudra cependant surveiller les parcelles les plus hâtives si nous avons dans les prochains jours des "coups de chaleur" assez marqués.

Tableau fongicide (bulletin n° 4)

Une erreur est à corriger pour le Tilt 125 dans les "Spécifiques maladies du feuillage": pour rouille jaune et rouille brune lire 1 et 1 c'est à dire bonne action.